

عملية تنظيف بطنى تشخيصى

الغرض/الفائدة المرجو من العملية: يتم الإجراء باستخدام المنظار البطني لتشخيص آلام البطن.

- قد يكون هنالك الحاجة إلى إجراء توسيع لعنق الرحم سواء باستخدام الأدوات الطبية الموسعة أو من خلال تحاميل مهبلية طبية (أدوية) يتم استخدامها قبل العملية لتوسيع عنق الرحم.
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وحول الجرح وستقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة.
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو إختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية.

المضاعفات: أي عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

مضاعفات أثناء العملية:

- قد لا نستطيع الدخول بجهاز المنظار لتجويف البطن والحوض وبالتالي عدم استكمال العملية المرجوة.
- قد يحدث جرح في المثانة أو الأمعاء أو الأوعية الدموية.
- قد يحدث جرح أو اختراق في جدار الرحم.
- قد يكون هناك زيادة في نسبة العقم وهي نادرة.
- قد يحدث نزف قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم.
- قد نحتاج إلى إجراء عملية فتح بطن استكشافية لتشخيص أي مضاعفات قد تحدث وقد نحتاج إلى اخذ استشارات من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل جراحي آخر وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرنينين.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

مضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث إتهاب في جرح العملية ومضاعفاته ومن ضمنه إنتان (تسمم الدم).
- قد تحدث آلام في البطن والكتفين.
- قد تظهر كدمات موضعية.
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية في حال تم الاشتباه باختراق أحد الأعضاء الداخلية وحسب ما يراه الأطباء مناسباً وإن حصل قد يكون هناك حاجة بإحتمال ضئيل جداً لإجراء فتحة للأمعاء خارج البطن.
- قد يحدث إتهاب بالحوض أو قد يحدث خُراج بالحوض أو تتكون التصاقات قد يُسبب الآلام المزمنة.
- قد يحدث انسداد أمعاء نتيجة حصول أو وجود إلتصاقات يتطلب إجراء عملية أخرى.
- قد يحدث فتق في موضع دخول المنظار.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية.

- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتنين.
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة.
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم.
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن اية اضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية.
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً.

نوع التخدير:

التخدير الكامل أو النصفى

التخدير الموضعي

التنويم الجزئي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأته الأنسب لقدرتها على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ

أنا المريضة قد تم شرح لي كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتني وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء و إنني استطيع الامتناع عن عملية في أي وقت لحين البدء بها.

اسم المريضة التوقيع التاريخ

اسم الشاهد التوقيع التاريخ