

عملية: تجريف رحمي لإزالة بقايا الحمل أو الحمل المنسي

اسم الإجراء: إجراء جراحي لإزالة الحمل المنسي أو بقايا حمل من داخل الرحم أو الحمل المنسي ويتم أخذ عينات من بقايا الحمل

- قد يكون هنالك الحاجة لإجراء توسيع لعنق الرحم سواء باستخدام الأدوات الطبية الموسعة أو من خلال تحاميل مهبلية طبية (أدوية) يتم استخدامها قبل العملية لتوسيع عنق الرحم
- بعد العملية سيكون هناك بعض الألم في منطقة الحوض وسنقوم بإعطاء الأدوية المسكنة اللازمة
- قد يحدث نزيف رحمي يستمر لأسبوعين على الأكثر مماثل لدورة شهرية
- قد يتم إلغاء أو التوقف عن استكمال العملية الجراحية في أي مرحلة من مراحلها لصعوبات فنية أو تقنية أو أن الفائدة المرجوة أضعف بكثير من فرص المضاعفات المتوقعة أو اختلاف التشخيص أو لأي سبب آخر دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية
- قد تتأخر العملية عن موعدها المقرر لأي سبب طبي أو غير طبي دون تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسؤولية مادية أو قانونية
- سيقوم بإجراء العملية الاختصاصي أو من لديه الصلاحيات الطبية المعمول بها في المستشفى

المضاعفات: إن أي إجراء أو عملية تحمل خطورة معينة ومضاعفات أثناء وبعد العملية، وهناك مضاعفات قد تحدث من التخدير سيتم شرحها من قبل طبيب التخدير.

المضاعفات أثناء العملية:

- قد يحدث نزف رحمي قد يستدعي نقل دم أو مكونات دم
- قد يحصل اختراق في جدار الرحم وقد نحتاج لمراقبة المريضة داخل المستشفى أو إجراء عملية جراحية (تنظير أو فتح بطن) لرتق هذا الاختراق (الثقب) وكل حالة تختلف عن الحالة الأخرى
- قد نحتاج إلى إجراء عملية تنظير استكشافية للبطن والحوض لتشخيص أي مضاعفات قد تحدث وقد نحتاج إلى اخذ استشارة من اختصاصات وأقسام أخرى وقد نحتاج إلى تداخل الجراحي آخر.
- قد يحصل جرح في عنق الرحم وقد نحتاج إلى رتقه
- قد يحدث تمزق في عنق الرحم أو الرحم مما يستدعي رتقه
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرئتين
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

المضاعفات بعد العملية:

- قد يحدث نزف رحمي قد يحتاج إلى دخول مستشفى أو مراقبة أو تداخلات جراحية أخرى
- قد يحصل نزيف لاحقاً بسبب وجود أنسجة حمل متبقية بالرحم قد تسبب ارتفاع أو عدم نزول هرمون الحمل مما يستدعي إجراء عملية تجريفات أخرى أو إعطاء أدوية أخرى
- قد يكون هناك ضرورة لإجراء عملية فتح بطن استكشافية حسب ما يراه الأطباء مناسباً
- قد يحدث التهاب بالحوض أو قد يحدث خراج بالحوض أو تكون التصاقات قد يسبب الألام المزمنة
- قد تتكون التصاقات داخل الرحم قد تسبب عقم ثانوي

- قد يحدث إرتخاء في عنق الرحم في الأحمال اللاحقة الذي قد يسبب إجهاضات في بداية النصف الأول من الثلث الثاني من الحمل أو ولادات مبكرة مما قد يستدعي وضع غرزة على العنق الرحم.
- قد تحدث حساسية لبعض الأدوية
- قد تحدث جلطات دموية بالأوردة العميقة التي قد تنتقل للرتين
- قد يكون هناك الحاجة إلى دخول قسم العناية المركزة
- قد يكون هناك احتمالية لإعادة الدخول للمستشفى وإجراء اللازم
- لا يتحمل الطبيب والمستشفى التكاليف المادية التي قد تترتب عن أية إضافات أو مضاعفات ناتجة عن العملية
- قد يكون هناك احتمال نزيف لوجود خلايا التروفوبلاست التي قد تسبب ارتفاع أو عدم نزول مستوى هرمون الحمل Bhcg مما قد يعني إجراء عملية أخرى أو إعطاء أدوية معينة للتخلص من بقايا الحمل مثل ميثوتركسيت
- قد تحدث الوفاة وهي نادرة جداً

نوع التخدير:

التخدير الكامل

التخدير النصفى

التخدير الموضعي

لقد قمت أنا الطبيب/الطبيبة بشرح كافة المعلومات المذكورة أعلاه بشكل كامل ومستوفي للمريضة وبما رأيته الأنسب لقدرة المريضة على فهم المعلومات بشكل كامل.

اسم الطبيب / ة التوقيع التاريخ

شاهد: التوقيع: التاريخ:

أنا المريضة قد تم شرح كل ما يتعلق بالعملية وقد تم إجابة جميع اسئلتى وأعرف انه يوجد مضاعفات لكل عملية ولا توجد ضمانة تامة لأي إجراء وإنني استطيع الامتناع عن العملية في أي وقت لحين البدء بها

اسم المريضة: التوقيع التاريخ

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ: